

Excursión a Ribera de Cardós, Pallars (Lérida)

por el

R. P. Longinos NAVÁS, S. J.

Con los mismos compañeros de excursión del año anterior 1928, don Juan Bta. de AGUILAR-AMAT y D. Ascencio CODINA realicé una fructuosa excursión a Ribera de Cardós (Lérida), población situada en orillas del río Noguera de Cardós, que en Llavorsí vierte sus aguas, perdiendo el nombre, en el río Noguera Pallaresa. Por ser localidad no explorada todavía, era de interés su estudio y prometía buenos hallazgos, aunque a la verdad la realidad superó nuestras esperanzas. La excursión la ideó el Sr. CODINA de acuerdo con el Sr. AGUILAR-AMAT que conocía aquel pueblo.

En la Pobla de Segur (Lérida). Convenido de antemano que el día 22 de Julio daríamos principio a la excursión, llegué el 21 por la tarde desde Zaragoza y Lérida, y saludado el Sr. AGUILAR que en casa de su hermano D. Enrique pasaba una temporada de verano, resolvimos los tres hacer una excursión a la mañana del día siguiente, mientras el Sr. CODINA llegaba de Barcelona. La exploración fue por las orillas de una acequia y del río Flamisell, y consistió por lo que a mí toca principalmente en Odonatos. La fauna entomológica de la región no parece muy rica y rara.

Por la tarde antes de que el Sr. CODINA llegase fuime a visitar el Colegio de Religiosas de la Sagrada Familia, instituto que me era conocido y simpático, y allí clasifiqué buen número de objetos de su museo incipiente. Y acordándome de que en todas partes soy jesuita, ofrecí una plática a aquellas buenas religiosas ávidas del pan de la divina palabra que rara vez reciben directamente; la aceptaron con la gratitud que se puede suponer y la escucharon sin perder sílaba, mientras los Sres. AGUILAR y CODINA paseaban por los alrededores de la población.

En Llavorsí (Lérida). El día 23, mientras esperabamos el auto que nos conduciría hasta la fábrica de Tirvia, me entretuve por las cercanías del río y puente en cazar lo bueno que se ofreciese, lo cual también realicé al regreso el día 26, no sin fruto.

Desde la fábrica fuimos a pie y cazando los cinco kilómetros que nos faltaban para llegar a Ribera de Cardós. Entre otras cosas salíonos al encuentro el codiciado lepidóptero *Parnassius Apollo* L., que pude cap-

turar, y en mayor número a la vuelta el Sr. CODINA. Parecía que la excursión comenzaba con buenos augurios.

En Ribera de Cardós. La proximidad de esta población al Pirineo y más que todo el río Noguera que de aquel desciende y las acequias que corren paralelas a él, me prometían, a mí en particular, muchos y buenos insectos de mi estudio.

Instalados en la fonda de D. Antonio Gabriel, aquella misma tarde nos dimos a explorar la acequia próxima, con tal fortuna que agoté los afileres que en la caja llevaba, cosa que rara vez me ha acontecido, y debí pedir suplemento de ellos al Sr. CODINA. Es verdad que el mismo Sr. CODINA contribuyó poderosamente a la caza, así este día como los siguientes.

Los demás días hicimos dos excursiones diarias, mañana y tarde, alejándonos cuando más 2 kilómetros de distancia, hasta los pueblos de Casibrós y Aynet, a orillas del mismo Noguera. En alguna de ellas nos acompañó el Sr. Gabriel con su hijo pequeñito.

Regreso. Explorados bien a nuestro gusto aquellos contornos, decidimos el regreso, que hicimos a pie y cazando desde Ribera a Llavorsí, parando para comer en la fábrica. De Llavorsí bajamos en auto el mismo día hasta la Pobla. Allí el día 27 dejamos a la familia del Sr. AGUILAR y en el auto de línea el Sr. CODINA y yo nos trasladamos en pocas horas a Barcelona.

En Barcelona. Aquí todavía me aguardaba una colección de insectos de la India y Annam que trajo poco antes el Sr. de AGUILAR-AMAT de una excursión realizada con el Sr. JUNCADELLA.

Resultados. De regreso al Colegio del Salvador de Zaragoza estudié los insectos de mi incumbencia recogidos, hallando con sorpresa cinco novedades para la ciencia, las cuatro de Ribera de Cardós. No podía preverse tanto. Naturalmente quedé con ganas de volver al mismo sitio en busca de otras novedades o de otros ejemplares de estas mismas.

ENUMERACIÓN DE LAS ESPECIES

Pondré aquí los insectos que he podido estudiar por mí mismo y me parezcan dignos de mención dejando otros al estudio de especialistas.

A los de esta excursión añadiré algunos de la India traídos por el señor AGUILAR-AMAT y otros capturados por el Sr. CODINA en Cataluña en anteriores excursiones.

Família DILÁRIDOS

22. *Lidar meridionalis* Hag. Tuxent (Lérida) 23. VII. 1920 Codina.

Família CONIOPTERÍGIDOS

23. *Coniopteryx tineiformis* Curt. Ribera.

MECÓPTEROS

Família PANÓRPIDOS

24. *Panorpa meridionalis* Ramb. Gósol, 23. VII. 1920; Guardiola de Berga, 29. VII. 1920. Codina.

SOCÓPTEROS

Família SÓCIDOS

25. *Graphopsocus cruciatus* L. Ribera.

Família CECÍLIDOS

26. *Cæcilus flavidus* Curt. Ribera.

Família MESOPSÓCIDOS

27. *Mesopsocus unipunctatus* Müll. Ribera.

PLECÓPTEROS

Família PÉRLIDOS

28. *Perla marginata* Panz. Ribera.
 29. *Isoperla rivulorum* Pict. Ribera.
 30. *Chloroperla torrentium* Pict. Ribera.

EFEMERÓPTEROS

Família LEPTOFLÉBIDOS

31. *Habrophlebia fusca* Curt. Ribera.

Familia EFEMERÉLIDOS

32. *Ephemerella ignita* Poda. Ribera.

Familia BÉTIDOS

33. *Bætis niger* L. Ribera.
 34. *Bætis bioculatus* L. Ribera.
 35. — *Rhodant* Pict. Ribera.

Familia SIFLONÚRIDOS

36. *Siphonurus pyrenaicus* sp. nov. (fig. 2).

Similis lacustri Eat.

Caput fulvum, duabus maculis subfuscis in vertice; oculis fuscis; ocellis late fusco limbatis; antennis subfuscis, apice pallidioribus.

Thorax fusco-ferrugineus, fulvo maculatus. Mesonotum lineis longitudinalibus pallidis, mesoscutello testaceo.

Abdomen superne fuscum, ad segmentorum basim pallidius, inferne fulvum, ad latera fuscum.

Pedes fulvi, anteriores subtoti ferrugineo-fusci, femoribus II et III subfusco longitudinaliter striatis.

Alæ hyalinæ, reticulatione fusca, in areis costali et subcostali citra regionem stigmaticam venulis per-pallidis, decoloratis.

Ala anterior (fig. 2) areis costali et subcostali vix flavido tinctis, regione stigmatica parce reticulata; cubito prope basim furcato; inter primam axillarem et marginem posteriorem 6-7 ramis, inter secundam axillarem et tertiam 1-4 venulis.

Ala posterior reticulatione areæ axillaris pallida.

Long. corp. ♀	9 mm.
— al. ant.	12 "
— — post.	6'2 "

Patria. Ribera de Cardós (Lérida), 23. VII. 1929. Col. m.

Aunque el ejemplar capturado es ♀ e imperfecto, me he atrevido a describirlo como especie nueva por no haber podido identificarlo con ninguna de las especies que me son conocidas; especialmente la palidez de la malla en algunas regiones de ambas alas no la veo mencionada.




Fig. 2

Siphonurus pyrenaicus ♀ Nav.
 Ala anterior

- a. Región estigmática.
 b. Región axilar.

Col. m.

Família ECDIONÜRIDS

37. *Rhithrogena semicolorata* Curt. Ribera.
38. — *aurantiaca* Burn. Ribera.
39. *Ecdyonurus fluminum* Pict. Ribera. Tuxent, 23. VI. 1920. Codina.
40. *Ecdyonurus forcipula* Pict. Ribera.

TRICÓPTEROS

A H